

کماد کی بھر پور اور معیاری پیداوار اُردیسٹا لائف سائنس کے ساتھ



اُردیسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمبیڈ

لارسینٹ

لارسینٹ ڈاؤ ایگرو سائنسز کی تیار کردہ ایک منفرد خصوصیات اور برسوں کی آزمودہ کواٹی کی حامل دوڑے ہے جو کہ کماد کے نقصان دہ کیڑوں دیمک، سیاہ بگ، اور مختلف اوقات میں حملہ آور ہونے والے بورر (چوٹی کا گڑووالا بورر، تنه کا گڑووالا بورر، جڑ کا گڑووالا بورر اور گوردا سپوری گڑووالا بورر) کا خاتمه کر کے بھرپور اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کا ضمن نہیں ہے۔

لارسینٹ میں موجود منفرد محلول سولویسو (Solvesso) شدید ترین گرم موسم (45°C) میں بھی اس کی کارکردگی ممتاز نہیں ہونے دیتا۔

خصوصیات:

- ✓ برسوں کی آزمودہ کواٹی، منفرد محلول سولویسو (Solvesso) کے ساتھ
- ✓ دیمک، سیاہ بگ، چوٹی کا گڑووالا بورر، تنه کا گڑووالا بورر، جڑ کا گڑووالا بورر اور گوردا سپوری گڑووالا بورر کا بہترین کنٹرول



جڑ کا گڑووالا بورر



تنه کا گڑووالا بورر



چوٹی کا گڑووالا بورر



گھوڑا مکھی



دیمک



گوردا سپوری گڑووالا بورر



سیاہ بگ



- ✓ شدید ترین گرم موسم میں بھی بہترین کارکردگی
- ✓ چکنے کی بہترین صلاحیت کی بدولت زیادہ دریتک تحفظ
- ✓ اسپرے کے فوراً بعد فوری اثر اور فوری تحفظ شروع
- ✓ لارسینٹ بذریعہ اسپرے اور بذریعہ آپاٹشی بہتر تناب کی حامل ہے۔

اسپرے پروگرام برائے کماد

برائے نقصان دہ کیڑے:

ہدایات	طریقہ استعمال	مقدار فنی ایکٹر	حل	مسئلہ
فصل کے کسی بھی مرحلے پر یہ کے کنٹول کیلئے لارسین بذریعہ آپاشی استعمال کریں۔	بذریعہ آپاشی	2 لیٹر	لارسین ^{40 لیٹر}	دیک
فصل کے ابتدائی مرحلے پر یا جب فصل پر فوٹیمہ اسپرے کرنامکن ہو	بذریعہ اسپرے	500 ملی لیٹر + 100 ملی لیٹر	لارسین ^{40 لیٹر} پروایلسز ^{40 لیٹر}	چوٹی کا گڑو وال/بور تند کا گڑو وال/بور جڑ کا گڑو وال/بور
فصل کے درمیانی اور آخری مرحلے پر یا جب فصل پر فوٹیمہ اسپرے کرنامکن نہ ہو	بذریعہ آپاشی	2 لیٹر	لارسین ^{40 لیٹر}	گوردا سپوری گڑو وال/بور گھوڑا مکھی بلیک بگ
کیڑوں کا حملہ نظر آنے پر اسپرے کریں۔	بذریعہ اسپرے	125 گرام 150 گرام فی 100 لیٹر پانی	موسپلان ^{20 لیٹر}	سفید مکھی (بانغ) میلی بگ
کیڑوں کا حملہ نظر آنے پر اسپرے کریں۔	بذریعہ اسپرے	400 ملی لیٹر	پائیری بر اکسیفن	سفید مکھی (انڈے، پچ)
کیڑوں کا حملہ نظر آنے پر اسپرے کریں۔	بذریعہ اسپرے	125 گرام فی 100 لیٹر پانی	بیسوس ران ^{10 لیٹر}	سرخ جوئیں سفید جوئیں
پہلی دفعہ گاؤ کے 30-40 دن بعد دوسری دفعہ گاؤ کے 50-60 دن بعد	کونپلوں میں ڈالیں	14 گلوگرام	کاربو فیوران ^{3 لیٹر}	تنے کی سنڈیاں

برائے جڑی بوٹیاں:

سفرشات برائے استعمال	مقدار	حل	مسئلہ
اپرے کرنے کے بعد گودی ہر گز نہ کریں۔ اپرے کیلئے مخصوص نوژل (فی جیٹ نوژل) استعمال کریں۔ اپرے کیلئے پانی کی مقدار 120 لیٹر کھیں۔	1 سے 1.5 لیٹرنی ایکٹر جب جڑی بوٹیاں اگلائیں۔	گینگوی ^{10 لیٹر}	چوڑے پتے والی، گھاس نما، ڈیلانا مہما
اپرے کیلئے پانی کی مقدار کم از کم 120 لیٹر کھیں۔	500 ملی لیٹرنی ایکٹر	کلین و بیو ^{15 لیٹر}	بیل والی جڑی بوٹیاں

اسپرے پروگرام برائے کماد

برائے بیماریاں:

مسئلہ	حل	مقدار	سفارشات برائے استعمال
رتاروگ کانگیاری چوٹی کی سڑاند سنکنگ	ٹاپسن - ایم	بذریعہ سے اچ 400 گرام فنی 1 لیٹر پانی بذریعہ اسپرے 400 گرام فنی 100 لیٹر پانی بذریعہ آپاشی 800 گرام فنی ایکڑ	جب بیماری کی علامات ظاہر ہوں اور فصل پر اسپرے ممکن ہو۔ جب بیماری کی علامات ظاہر ہوں اور فصل پر اسپرے ممکن نہ ہو۔
کماد کی برگی دھاریاں	ہوکو کاسومِن	بذریعہ اسپرے 600 ملی لیٹر فنی ایکڑ بذریعہ آپاشی 1200 ملی لیٹر فنی ایکڑ	بیماری کی علامات ظاہر ہوں پر

برائے پیداوار میں اضافہ:

حل	مقدار فنی ایکڑ	ہدایات	فوائد
پائیلینس بائیو اسٹیمولاٹ (Bio-Stimulant)	1 لیٹر	اگاؤ کے فوراً بعد بذریعہ آپاشی استعمال کریں۔ 10-15 دن کے وقہ سے دوبارہ استعمال کریں۔	بڑوں کی لمبائی اور Root Fiber کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ پودوں میں پانی اور درسرے خواہ کی اجزاء (زمینی کھاریں) کو جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ بڑوں کی ساخت اور کارکردگی کو بہتر بنانا کپڑے کو بھر پور اور تو ان آغاز فراہم کرتا ہے۔
اسائی سٹار بائیو اسٹیمولاٹ (Bio-Stimulant)	200 ملی لیٹر	بہترین نتائج کیلئے 15 دن کے وقہ سے کم از کم 2 اپرے کریں۔ نوت: اگاؤ سے 60 دن کی فصل پر استعمال کریں۔	فصل کو منی دیوار سے باہر لٹکتا ہے۔ خنک سالی اور پانی کی کمی بیشی کے اثرات سے فصل کو محظوظ رکھتا ہے۔ نامناسب موئی حالات میں فصل کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔
واٹیلس بائیو اسٹیمولاٹ (Bio-Stimulant)	500 ملی لیٹر	بہترین نتائج کیلئے 15 دن کے وقہ سے کم از کم 2 اپرے کریں۔ نوت: 100 دن کی فصل پر اسپرے شروع کریں۔	GAEM Simple: یکنما لوچی کی بدروالت، فصل کے ہار موٹی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ Zinc Sulfate Monohidrate: بڑھوتری میں محاون ہار موڑنے کے بہتر اثرات Magnesium Sulfate Heptahydrate: یعنی تایف کے عمل کو بہتر کرتا ہے۔ Manganese Sulfate Monohidrate: پوری اور لاما نیکو اسٹبل بانے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور بڑوں میں پانی اور خوار کی اجزاء لینے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔
کرسٹافید 15:18:18	2 سے 3 کلوگرام فی 100 لیٹر پانی	ابتدائی بڑھوتری کے مرحلہ پر استعمال کریں۔	فصل کی بڑھوتری کے عمل کو تیز اور ساخت کو بہتر کرتا ہے۔ نوآپروڈوں کا system میں داخل ہو کر خوار کی اجزاء کی فراہمی کو لینی بنتا ہے۔ فصل کو منی دیوار سے باہر لٹکاتا ہے۔
کرسٹافید SOP 50 اشائی سلفر کے ساتھ	12.5 کلوگرام بذریعہ آپاشی	پہلی دفعہ جب فصل 100-120 دن کی ہو جائے۔ دوسری دفعہ جب فصل 150-170 دن کی ہو جائے۔	Sucrose کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ جکلی بدروالت شوگر کی رکوری میں اضافہ کرنا غیر مموج سلفر فصل کی افزائش، طاقت اور پیہا اور کیلئے ضروری ہے۔ فصل گرنے سے محظوظ • ذائقہ اور وزن میں اضافہ کا بھر پور شامن

اریسا کا سلفر 2 کلوگرام یوریا کے ساتھ ملا کر بذریعہ آپاشی استعمال کریں۔



کرستافیڈ

Soluble SOP-50



اسپین سے
درآمد شدہ

کماد وزن دار اور گرنے سے محفوظ - بہتر شوگر ریکوری

کرستافیڈ اسپین سے درآمد شدہ اعلیٰ کوائٹی کی حامل پراؤ کٹھ ہے جو کہ پانی میں 100 فینڈل حل پذیر ہے۔

اس میں موجود بہترین قسم کے اجزاء ترکیبی پودوں کی غذائی ضروریات کو پورا کر کے بہترین نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔

کرستافیڈ پودے کی جڑوں کی بڑھوٹری میں مگارثابت ہوتا ہے۔

کرستافیڈ میں موجود پانی اور غذائی اجزا کو پودے کی جڑوں سے جذب کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔

کرستافیڈ پودوں میں موجود پوشاش دوسرے غذائی اجزا کو زیادہ مقدار میں پتوں سے پھل کو منتقل کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔

کرستافیڈ پودوں کیلئے نقصان دہ عنصر مثلاً سوڈا یم اور کلورایڈ سے مکمل پاک ہے لہذا اس کے استعمال سے فصل پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔

کرستافیڈ میں موجود سلفر کی اضافی مقدار پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کیلئے ضروری ہے۔

کرستافیڈ خاص طور پر پھل کی بڑھوٹری کے وقت دینے کے لیے موزوں ہے تاکہ پھل زیادہ دریتک استعمال کے قابل رہے۔

کرستافیڈ کماد کی فصل میں شوگر کوری بڑھانے کے ساتھ ساتھ گنے کے وزن اور موٹائی میں اضافہ کرتا ہے۔

کرستافیڈ کی تھوڑی سی مقدار دے سچ وقت پر اضافی پیداوار

سفارشات برائے استعمال

فصل	مقدار	وقت استعمال	فوائد
کماد	12.5 کلوگرام بزریعہ آپاشی	پہلی دفعہ جب فصل 100-120 دن کی ہو جائے۔	<ul style="list-style-type: none"> پتوں کے اندر پوشاش کی مسلسل فراہمی جڑوں کو لوگنا کرنے اور زمین سے خوراکی اجزاء لینے کی صلاحیت میں اضافہ پتوں کے سائز اور خورک بنانے کے عمل میں بہتری
		دوسری دفعہ جب فصل 150-170 دن کی ہو جائے۔	<ul style="list-style-type: none"> گنے میں شوگر ریکوری بہتر گنے میں خوراکی اجزاء کا بہتر بہاؤ فصل گرنے سے محفوظ



معیاری اور وسیع پر اڈ کٹ رنج کے ساتھ ...
کسان کی خدمت میں مصروف عمل



مزید معلومات کیلئے
اڑیسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس : تحریر ٹاور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ کراچی 753050 پاکستان - فون: (+92-21) 34522611-3

ریجنل آفس : جید آباد: 022-3880103 • ڈین: 018-042-37513154 • پشاور: 061-6537315 • لارڈ: 091-2964529