

ماحول اور جنگلی حیاتیات: آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور راجہا ہوں کو زہری آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات و مچھلیوں کی جانے افزائش اور گھریلو استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔
ابتدائی مٹی امداد: زہر لگنے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور لیبل ضرور دکھائیں۔ آٹکھ میں چلے جانے کی صورت میں آنکھ کو فوراً پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد پر لگنے کی صورت میں پانی اور صابن سے دھوئیں۔

گائے: اس ذریعہ زہر کا استعمال چونکہ کھیتی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا زہر کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی گاڑی نہیں دی جاسکتی۔ زہر کو تاریخ تیار کی کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وراثتی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metalized floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.
Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Manufactured & Formulated By:

M/s Jianguo Institute of Economes Co. Ltd.,
95 Huanyuan N.Road, Economic Development Zone, Jinan, Jianguo, China

Imported By:

M/s AQ Enterprises.
Suite #1-C, 1st Floor, Expo Tower, Block- H/3, Johar Town, Lahore

Packed By:

Capricorn Associates
Plot # 34, Sector 7/A, Korangi Industrial Area Karachi. Ph:021-35088346
(Under supervision of AQ enterprise & Arysta LifeScience Pakistan)

رجسٹرڈ بندھن:

آریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

فرخ، بلاک 5/A، ای۔ای۔سی۔، گلاس، بلاک 6، ایچ۔ایچ۔ایچ۔، لاہور۔ فون: 34522611-3

فون: 34522611-3 (+92-21)

www.arystalifesciencepk.com

ونسٹا



قدر سے خطرناک

- بچوں کی تکلیف سے دور رکھیں۔ حاملہ کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں
- استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھیں
- کوئی نقص نہیں پہنچائیں۔ ڈاکٹر سے زچہ رانی ملامت کے مطابق علاج کرائیں

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں

نوٹ: پیک کے اندر 60 گرام **ونسٹا** + 60 ملی لیٹر ایڈجیونٹ استعمال کیلئے موجود ہے۔

WINSTA

30% WP



ونسٹا ایک وسیع الاثر زہر ہے جو جان کو نوکیلے پتوں والی، چوڑے پتوں والی اور گھاس نما جڑی بوٹیوں کا موثر خاتمہ کرتا ہے۔ **ونسٹا** کو آبی جڑی بوٹیوں پر اسپرے کے بعد اگلے پتوں اور جڑوں میں سرایت کر کے 15-20 دن کے اندر جڑی بوٹیوں کا پتوں سے جڑوں تک مکمل خاتمہ کرتا ہے۔ نتیجتاً ختم شدہ جڑی بوٹیاں دوبارہ آگ نہیں پاتی اور دھان کی فصل نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔

استعمال کے لئے سفارشات:


دھان	فصل	جڑی بوٹیاں		مقدار فی ایکڑ	وقت برائے برداشت	REI
		نرسری	دھان کی جڑی بوٹیاں			
فصل <td>نرسری</td> <td>50 گرام</td> <td>14-7 دن</td> <td rowspan="2">24 گھنٹے</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td>	نرسری	50 گرام	14-7 دن	24 گھنٹے		
	فصل	60 گرام				

ونسٹا اور ایڈجیونٹ کا طریقہ استعمال:

محلول کی تیاری:



ایک ہائیڈرو اسٹریٹ 8 لیٹر صاف پانی ڈالیں۔ ایک ہائیڈرو اسٹریٹ 8 لیٹر صاف پانی ڈالیں۔ 60-50 گرام زہر اور 60-80 ملی لیٹر ایڈجیونٹ نکال کر پانی میں ڈالیں اور دونوں کا گھسی طرح پانی میں کس کریں اور خوب ملائیں۔ دنانے کے بعد 50-60 گرام زہر اور 60-80 ملی لیٹر ایڈجیونٹ نکال کر پانی میں ڈالیں اور دونوں کا گھسی طرح پانی میں کس کریں اور خوب ملائیں۔



اسپرے کا طریقہ:

اسپرے کے وقت کھیت میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ گہرائی موجود ہونا چاہیے۔ پہلے اس کھیت سے نکالنا چاہیے۔

تیار شدہ محلول میں 1 لیٹر پانی سے آدھی گھری ہوئی اسپرے مشین میں ڈال کر خوب ملائیں۔

مزید پانی ڈال کر اسپرے مشین چلائیں اور کھیت پر پانی کا محلول پڑے۔ پانی میں حل ہو جائے۔

لاپ (پھیری) کی پھلی 12-15 دن، اگلے کھیت میں پھیلنے سے پھری مشین کا اس طرح اسپرے کریں کہ اس مشین سے آٹھ کا آٹھوں حصہ (کانال) پھر اسپرے ہو جائے۔

اس طرح ایک ایکڑ میں پھر اسپرے کیلئے اور جڑی بوٹیوں کے موثر خاتمہ کیلئے 15 لیٹر 8 لیٹر پانی اسپرے کریں۔

ایک ایکڑ پھر اسپرے کے بعد 24 گھنٹے بعد کھیت میں 3 دن پانی نہ رکھیں۔

نوٹ: تیار شدہ محلول میں سے دو ہائی اسپرے مشین میں ڈالنے سے پہلے محلول کا گھسی طرح ملائیں اور پھر اسپرے مشین میں دو ہائی ڈالنے سے پہلے کریں۔ دنانے کا پانی چھت کے ساتھ کس کے پھر اسپرے فرم ہو نہ ہوگا۔ اسپرے کے لئے ہر پانی مائیکرو ڈزل (پہلی جیٹ پیلاڈ جیٹ) کا استعمال کریں۔

احتیاطی تدابیر: زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی شیاہ، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل پیکٹ میں بند چھنڈی، خشک اور ہوا دار جگہ میں سنور کریں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (مثلاً پیرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے، لوگ بوٹ) ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آئے دیں۔ اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔

اسپرے کے دوران کھانے پینے اور گرہنہ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہا لیں اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آٹکھ، جلد یا ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کے خالی ڈبوں کو ہرگز گھر ملیو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر پاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں ودائیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔

زہر پاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

اسٹورج: **ونسٹا** کو اصل سر بمبر پیکٹ میں سورج کی روشنی،

نچی اور آگ سے دور چھنڈی اور ہوا دار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے

پینے کی شیاہ سے علیحدہ، بچوں اور جانوروں کی پہنچ سے دور ہو۔ اس میں

تالا لگا ہوا اور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھے۔

بتانے ہوئے طریقے کے مطابق دوا کو مقررہ معیار تک اسٹور کیا

جاسکتا ہے۔

ونسٹا مچھلیوں کیلئے خطرناک ہے جبکہ شہد کی کیوں کیلئے

کیلئے معمولی خطرناک ہے۔

