

تاکومی

TAKUMI 20% SC

**اہتمامی امداد:** زہر گتے کی صورت میں فوراً اکر سے رجوع کریں اور پھیل ضرور دکھائیں۔ آگوش چل جانے کی صورت میں اکر کو فوراً پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں اور 2 اکر سے رجوع کریں۔ جلد پر گتے کی صورت میں پانی اور صابن سے دھوئیں۔  
**گارنٹی:** اس زرعی زہر کا استعمال چونکہ گتے کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا زہر کے معیاری ہونے اور پھیل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ وہاں کاربن تجارتی کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ درستی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔

**Warranty:** Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & installed floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.  
**Storage Stability:** Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Registration No. Reg. PAK / APO / 1098 / 2018

Manufactured & Formulated By:

Nihon Nohyaku Co., Ltd.,

19-8, Kyobashi, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Packed By:

Capricorn Associates

Plot # 34, Sector 7/A, Korangi Industrial Area Karachi. Ph: 021-35068348

(under supervision of Arysta LifeScience Pakistan)

:- درآمد و تقسیم کنندگان :-

اریستا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

قذوق، بنگلہ پورہ 5/1، پی ای سی، ایچ ایس، بلاک نمبر 6، کارپوریشن کارچی 75350 پاکستان۔ فون: 3-34522611 (92-21)

www.arystalife-science.com

کیڑے مار زہر  
(صرف زرعی استعمال کے لئے)

تاکومی

20 فیصد ایس سی

NET CONTENT  
120 ملی لیٹر

Active Ingredients:  
Flubendiamide : 20 % (w/w) (222 g/l)  
Inert materials : 80 % (w/w) (Balance to make 100%)



زہر  
قدرت زہرناک

- بچوں کی آگوش سے دور رکھیں
- حادثے کی صورت میں فوراً اکر سے رجوع کریں
- استعمال سے پہلے پھیل ضرور پڑھیں
- کوئی قسم میں تریاں نہیں
- ڈاکٹر کے زیر نگرانی علامات کے مطابق علاج کریں

انتباہ: زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں



Arysta  
LifeScience

**احتیاطی تدابیر:** زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل بیکنگ میں بند، ٹھنڈی، خشک اور ہوا دار جگہ میں سنو کریں۔ زہر کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (اچھرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے) ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔

اسپرے کے بعد نہالیں اور کپڑے دھولیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔

زہر کی خالی بوتلوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر آبپاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔

**اشتراک:** تاکومی کو الٹھی کے آیز سے اور تانبے کے مراکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پھپھوندی کش ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں انکی طبعی آمیزش اور فصل پر اثرات دیکھنا کامشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔



**تاکومی** ایک موثر کیڑے مار زہر ہے جو کہ بینزیڈیکارباکسائڈ گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے بہترین طریقہ اثر کی وجہ سے لشکری سنڈی، ہیلیپوٹیس اور دیگر لیپڈ و پیٹرا لاروہ کا موثر کنٹرول کرتا ہے۔

**استعمال کے لئے سفارشات:** (استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں)

فصل	کیڑے	مقدار فی ایکڑ	وقت برائے برداشت
کپاس	لشکری سنڈی، ہیلیپوٹیس	120 ملی لیٹر	25 دن
گوبھی اچھول گوبھی	ڈائمنڈ بیک ماتھ، لشکری سنڈی	70 ملی لیٹر	2-3 دن
نماز	فروٹ بورر (ہیلیپوٹیس)	60-70 ملی لیٹر	2-3 دن

**نوٹ:** • کیڑوں کے معاشی نقصان وہ حد پر پہنچتے ہی اسپرے کریں • سنڈیوں کا حملہ برقرار رہنے کی صورت میں 7-10 دن کے وقفے سے اسپرے دوبارہ کریں • یہ دوست کیڑوں کیلئے نسبتاً محفوظ زہر ہے، پرندوں اور شہد کی مکھی کیلئے بے ضرر ہے جبکہ مچھلی، آبی جانداروں کیلئے مضر ہے • تاکومی کا 24 REI گتے ہے۔

