

زادیم پرو ٹیکنالوچی™

ایوبیو

۱۴۸۰ میں سی

جہلساؤ اور پھپھوندی کے کنٹرول میں ایک نئی جدت
صحت منفصل اور اضافی منافع بخش پیداوار



اریستا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لیمیٹڈ


ایوبیٹو

ایوبیٹو کا موثر عنصر فلوکسٹربن (Fluoxastrobin) جدید پھپھوندی گش اسٹرو بائیورین (Strobilurin) فیلی کا ایک جدید اور منفرد زہر ہے۔ یہ اپنی منفرد زائیلیم پروٹینکنا لو جی کی بدولت پتوں اور جڑوں میں انہائی تیزی سے جذب ہو کر پودے کے تمام حصوں میں یکساں طور پر پھیل جاتا ہے اور مختلف یماریوں مثلاً گیتا جھلساؤ، پچھیتا جھلساؤ، روئیں دار پھپھوندی، پاؤ ڈری ملڈ یو وغیرہ کے خلاف انہائی موثر کنٹرول دیتا ہے۔

ایوبیٹو کا طریقہ اثر:

ایوبیٹو دونفرہ طریقوں سے اثر انداز ہو کر پھپھوندی کی موت کو لینی بنتا ہے۔

- ایوبیٹو سپور کے سیل میں داخل ہو کر مانٹو کونڈریل (Mitochondrial) کے فنشن میں مداخلت یعنی "پھپھوندی کے سپور کے سانس لینے کے عمل کو روکتا ہے۔"
- ایوبیٹو پھپھوندی کے سپور میں سائٹو کروم بی / اسی اکمپلکس کے درمیان الیکٹرون کے انتقال اور توانائی (ATP) کے بننے کے عمل پر اضافہ ہو کر پھپھوندی کے خلیے کی تمام بائیو کیمیکل (Biochemical) عمل کو روک دیتا ہے یعنی "پھپھوندی کے توانائی بننے کے عمل کو روکتا ہے۔"




ایوبیٹو کے فوائد:

پتوں میں بہترین سرائیت

1

ایوبیٹو ... مؤثر اور تیز سرائیت پذیر 15 منٹ کے اندر اندر حفاظتی عمل شروع

ایوبیٹو Xylem-Pro Technology کی بدولت اسٹرو بائیکلورین سے تعلق رکھنے والے دوسرے ہم اثر پروڈکٹ سے منفرد عمل کرتا ہے۔ ایوبیٹو Xylem-Pro Technology کی بدولت پودے میں پانی کے مالکیون کے ساتھ مل کے 15 منٹ کے اندر اندر حفاظتی عمل شروع کر دیتا ہے اور 6 سے 9 گھنٹے میں پورے پودے میں یکساں پھیل جاتا ہے۔ حفاظتی اور معالجاتی طریقے سے بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے۔



ایوبیٹو زبانک کے ذریعے پتوں کی نئی پھوٹ میں داخل ہو کر پودے کے نوزائیدہ حصوں (نئے پتوں، نئی جڑوں) کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔



واسیع دائیرہ اثر

2


اگیتا جمساڈ



پچھیتا جمساڈ



روئین دار پچھوندی



پاؤ ڈری ملڈ یو



جدید اسٹروبائیورین (Strobilurin) فیلی سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایوبیٹو چار بڑے





براؤن سپاٹ



انٹریکنوز



گی سٹم بلائیٹ



روٹ رات



لے گروپ سے تعلق رکھنے والی تمام پھپھوندیوں سے لگنے والی بیماریوں پر موثر ہے۔



3 بارش میں بھی بہترین کارکردگی



زاں یونیکنالوجی کی بدولت ایوبیٹو سپرے کے فوری بعد پتوں میں جذب ہو کر پودوں میں بیماریوں کی خلاف حرکت میں آ جاتا ہے اور یوں بارش ہونے کی صورت میں اسکی کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

4 ٹن فارمرز کا اولین انتخاب

ٹنل کے اندر درجہ حرارت کا بڑا ہم کردار ہے۔ درجہ حرارت کے اُتار، چڑھاؤ کا اثر ٹنل میں موجود سبزیات پر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پودے کا ہارمونیل سسٹم خصوصاً پودے میں ایتها لیں (Ethylene) غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً پودے پر منفی اثر پڑتا ہے اور زمیندار کو بیماری کے اسپرے کے ساتھ ساتھ اضافی پروڈکٹ استعمال کرنا پڑتا ہے۔

ایوبیٹو اپنی منفرد خاصیت کی وجہ سے بیماری کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ٹنل کے اندر موجود فصل میں ایتها لیں کو متوازن کر کے فصل کو صحیت مند اور خوش نما بناتا ہے۔ 15 منٹ کے اندر اندر جذب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے ٹنل کے اندر زیادہ نہیں میں بہترین کارکردگی دیکھتا ہے۔



5 مختصر REI

مختصر (REI) صرف 12 گھنٹے



ایوبیٹو صحتمند فصل اور اضافی منافع بخش پیداوار

6



• ایوبیٹو پودوں میں اسٹھنائیں (Ethylene) کے زیادہ بننے کے عمل پر انداز ہو کر اسکی مقدار کو متوازن رکھتا ہے اور یوں پودوں کی نشوونما/بڑھوتری پر منفی اثرات مرتب نہیں ہونے دیتا۔

• ایوبیٹو پودوں کی کاربن اسیملیشن (Carbon Assimilation) کو بڑھاتا ہے نتیجًا پودے میں ضیائی تالیف کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور پودے میں خوراک بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔

• ایوبیٹو پودوں میں ناکٹروجن فیکش (Nitrogen Fixation) کے عمل کو بہتر کرتا ہے نتیجًا پودوں کی پانی و دیگر غذائی اجزاء لینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور پودہ بھر پور پیداوار اٹھاتا ہے۔

استعمال کے لئے سفارشات

وقتہ برداشت	مقدار	بیماری	فصل
7 دن	100 ملی یٹرفی 100 لیٹر پانی	اگیتا، پچھیتا جلساؤ اور ریز کٹونیا (میک سکر)	آلود
28 دن		شیتھ بلاکیٹ، براون لیف سپاٹ، کرٹل سمت (موجہ کا کالا پن)، گروں کی بلاسٹ	چاول/دھان
40 دن		رسٹ	گندم
3 دن		الٹر نیر بالیف سپاٹ، پاؤڈری ملٹی یو، براون سپاٹ	سویاٹین
3 دن		اگیتا، پچھیتا جلساؤ	پھل والی بزریاں (بیگن، سرچ، نماز)
1 دن		اگیتا، پچھیتا جلساؤ اور ریز کٹونیا	پتے والی بزریاں
1 دن		انقر کینوں، اگیتا جلساؤ، بیلن رات، ڈاؤنی ملٹی یو، پاؤڈری ملٹی یو، گی سٹم بلاکیٹ	بیلوں والی بزریاں (خربوزہ، تربوز، کھیر، اسکواش، بنیذے وغیرہ)
1 دن		انقر کینوں، پاؤڈری ملٹی یو، گرے مولڈ، کورٹنیم بلاکیٹ، سکیپ	سرایہری، کریمیری، بلویہری، آلو بخارہ، آڑ، خوبانی
-		انقر کینوں، پاؤڈری ملٹی یو، لیف سپاٹ، روٹ رات، مرچ جاؤ، رسٹ	نمائشی پودے

نوت:

بیماریوں کیلئے سازگار موگی حالات شروع ہوتے ہی **ایویویٹو** کا تنازعی اپرے شروع کر دیں۔

بیماری کے ظاہر ہوتے ہی 7-10 دن کے وقت سے اپرے کر دیں۔

بیماری کی شدت میں اپرے کا وقته کم رکھیں۔



مزید معلومات کیلئے

اُریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس : ٹھرڈ فلور، بلڈنگ نمبر A/5، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ال۔ بی۔ بلک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان - گون: 3-3 (092-21) 34522611-09

ریجنل آفسز : 042-37513154-061 • لاہور: 022-3885022 • جیلانی: 091-2964529 • پشاور: 091-65-6537315-18

www.arystalifesciencepk.com