

ابتدائی طبح **ام**اد: زہر نظنے کی صورت میں الٹی نہ کرا کمیں ۔ آنکھ میں جلے جانے کی صورت میں آنکھ کو فوراً پانی ے15 منٹ تک دھوئیں اور ڈاکٹرے رجوع کریں۔جلد پر نگنے کی صورت میں پانی اورصابن سے دھوئیں۔ <mark>گارنی</mark>: اس زرمی ز جرکااستعال چونکه مینی که دائر داختیارے باجر ہے۔لہذاز جرے معیاری ہونے اور لیسل سر درج شد د مقدار کے علاوہ کسی اور قتم کی گارٹی نہیں دی جائلتی۔ دوا کو تاریخ تیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ورانٹی میں دی گئی شرائط کو مدنظر رکھا جائے۔

کاسوُمن آیی حیات کیلیے مصربے۔ زرعی یانی کی گزرگاہوں ، مچھلیوں کی افزائش کی جگہوں اور تالاب کوز ہر آلودہ مذکریں۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metaled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0C° and above 35C° But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty



Mitsui Building No 2, 4-20 Nihonbashi Hongoku-Chq,4- Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

Packed By:

Capricorn Associates Plot # 25. Sector 19. Korangi Industrial Area Karachi, Ph:021-35068346 (Under Supervision of Arvsta Lifescience Pakistan)

-: درآمد ونقيهم كنندگان :-

أرديبيتا لائف سائنس يكستان (يرائيوبيث) لميثد

تحردْ فلور، بلذتك نمبر 5/A، بي _اي _ي _ايح _اليس، بلاك نمبر 6، شاہراه فيصل كرا يمي 75350 باكستان _ (+92-21) 34522611-3 بأرب www.arvstalifesciencepk.com





Active Ingredients: KASUGAMYCIN :..... 2.0 % (w/v) 2.3 % (w/w) Others :..... 98.0 % (w/v)

> • يور كالتى - دور تحين • حادث كاسورت ين فورا ذاكر - رجوع كرين • استعال - يساييل خرور يزهاين کوئی تخصوص تریاق نین
> داکٹر کے زیر گرانی علامات کے مطابق علاج کرا کمیں

600 ملي ليغر انتباه: يوزجر ب إ اختياط سے استعال كريں



Arysta

احتیاطی م**دامیر**: ز ہرکوبچوں کی پنچ سے دوررکھیں ۔کھانے بینے کی اشیاءخوراک ،خوراک [۔] کی دواؤں اور جارے سے دوررکھیں۔ زہر کواصل پیکنک میں بند، ٹھنڈی خشک اور ہوا دار جگه میں سٹور کریں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (مثلاً ایبرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے، لونگ بوٹ) ضرور استعال کریں۔اسپرے کو آنکھ، جلدیا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندرجانے دیں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے برہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہالیں اور کپڑے دھولیں۔ زہر کوآ بیاشی کے ذِرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کی خالی بوتلوں کو ہر گز گھریلویا دیگر کسی اور مقصد کیلئے استعال میں نہ لائیں ۔ انہیں تو ڑ کرآ ہپاشی اور پینے کے یانی کے ذرائع سے دورزمین میں دبادیں۔ ہواکی مخالف سمت میں سپرے نہ کریں۔ سپرے کی فوار میں کام سے پر ہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعےاندرجانے دیں۔ زہریا شی کے دقت کیڑے اور جو تا آلودہ ہونے کی صورت میں تبديل كرليس اورصابن سے اچھی طرح دھوليں۔ اشتر**اک: کاسوجن** کوالگلی کے آمیز ےاور تانبے کے مراکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مارادر پھیچوندی گش ادویات کے ساتھ ملا کراستعال کیا جاسکتا ہے البیتہ مقامی حالات میں انکی طبعی آمیزش اور فصل پر اثرات د نتائج کا مشاہدہ کر لیناضر وری ہے۔

HokkoKasumín كاسومن

كالسوص بوكوكيميكل اندُسرُ مي جايان كى تياركرده ايك وسيع الاثر سرائيت يذير يشجهوندى كُش اوربيكشر يأكش دوابے۔ بیدهان کی فصل میں بلاسٹ وبلائیٹ کے خاتمہ کیلئے نہایت مؤثر ہے۔ اسکےعلاوہ یہ بہت ی فصلوں، سنریات اور باغات میں مختلف بیاریوں کےخلاف بھی نہایت مؤٹر ہے۔ اپنے حفاظتی اور معالجاتی الرات کی بدولت کاسومن بہترین نتائج کی حامل دواہے۔

استعال کے لئے سفارشات: (استعال سے پہلے بوتل کواچھی طرح ہلا لیں)

REI	وقفه برداشت *(PHI)	مقدار	يپارى	فصل
24 گھنے	14 ول	600 ملی لیٹر فی ایکڑ	بلاسٹ یا بھر بیسی کا بیکٹیریل براؤن راٹ بیکٹیریل براؤن سٹرپ (بلائیٹ)	دھان
12 گھنے	1 دن	800-600 ملى ليغر في ايكر	بيكٹر يل سپاٺ	مرچ
12 گھنے	1 ولن	800-600 ملى ليثر في ايكرُّ	بيكٹر ميل سپاٺ	کھیرا
12 گھنے	4 دن	800-600 ملى ليثر في ايكرُ	ليف مولدٌ ، بيكرُ بل سپاٺ	ٹماٹر
12 کھنے	14 دن	600 ملی لیٹر فی ایکڑ	سکیب ، راٹ	آلو

بدایات برائے استعمال : بیاری کی علامات ظاہر ہوتے ہی ایک بارمقرر کردہ شرح سے اسپر کریں۔ دوسری مرتبہ پنے نکلنے پراورا گر ضرور کی ہوتو دو ہفتے بعد تیسر کی دفعہ اسپر کریں ہردفعہ اچھی طرح اسپر کے کیا جائے۔ * یی ان کار الله برداشت: آخری اس اور برداشت کے درمیان وقفه

