


60 میں

پرو ایکس

گلابی سندھی کے کنٹرول کا جدید و منفرد حل

گلابی سندھی سے ملن جات ... صاف سترھی کپاس



جدید و منفرد ذہر
یورپ سے درآمد شدہ



UPL
OpenAg™

اریستا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پروایسز

گلابی سندی سے ملن جات ... صاف ستھری کپاس

گلابی سندی ... کپاس کا خفیہ دشمن

گلابی سندی کا شمار کپاس کے انتہائی ضرر رسمیں کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر کپاس کے پودے پر بچلتی پھولتی ہیں۔ اس کی مرغوب غذا کپاس کے پھول (کلیاں)، کچے ٹینڈے اور کپاس کا نجح ہوتا ہے۔ گلابی سندی کی مادہ پھولوں اور نرم ٹینڈوں کے بغلوں میں انڈے دیتی ہے۔ جس سے سازگار حالات میں 4 سے 5 دن کے بعد سندیاں نکل آتی ہیں۔ چھوٹی سندیاں انڈوں سے نکلتے ہی کلیاں کھاتی ہیں یا کچے نرم ٹینڈوں کی موجودگی میں آدھے سے ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹینڈوں میں سرگ بنا کر داخل ہو جاتی ہیں اور نجح تک پہنچ جاتی ہیں۔ حملہ شدہ ٹینڈوں کی پھٹی کاریشہ کمزور اور دغدار ہو جاتا ہے جس وجہ سے ایسی کپاس کا مارکیٹ میں ریٹ کم ملتا ہے اور کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے۔

گلابی سندی کے حملہ کی پہچان

مدھانہ نما پھول



نرم یا کچے ٹینڈے کے ہونے کی صورت میں گلابی سندی کی موجودگی

گلابی سندی کے کنٹرول کا جدید و منفرد حل

جدید ترین پائری ٹھرا انڈ

پروایسز

Cheminova - Denmark کی تیار کردہ جدید ٹکنالوجی۔

پائری ٹھرا انڈ خاندان کی پانچویں نسل کا پہلا اور واحد زہر۔

اصل زہر میں صرف موثر آئوسومر زکی موجودگی سے عام پائری ٹھرا انڈ کی نسبت

زیادہ موثر کر کر دی۔



پروایسز کا موثر غصراً ایک خاص قسم کی خورد بینی کپسول میں بند ہونے کی وجہ سے زیادہ موثر اور عرصے تک اثر برقرار رکھتا ہے۔ اس پرے کے بعد فصل پر موثر غصراً کی زیادہ عرصے تک موجودگی گلابی سنڈی کا بہتر کنٹرول دیتی ہے۔

خصوص (Micro Encapsulated Suspension) فارمولیشن جو کہ چھوٹے اور بڑے سائز کے خورد بینی کپسول پر مشتمل ہوتی ہے جس سے مداہانہ نما پھول میں پھیپھی ہوتی گلابی سنڈی کا نک پاناشکل ہوتا ہے۔ عام پاڑ تیھرا مل کی طرح پتوں کو خنت نہیں کرتا۔



سنڈ پوں خصوصاً گلابی سنڈی پر موثر اور دیر پا کنٹرول۔ ڈسکی کاٹن بگ اور ریڈ کاٹن بگ کے خلاف انتہائی موثر۔ کم شرح استعمال کی بدولت ماحول کی آسودگی میں خاطر خواہ کی۔ فصل پر کوئی منفی اثر نہیں اور استعمال کرنے والے کیلئے محفوظ۔

گلابی سنڈی کے موثر کنٹرول کیلئے اریسطا کا اسپرے پروگرام

بچھے کئی سالوں سے کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ نظر آیا ہے۔ جس کا زمیندار کو خاطر خواہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس سال بھی کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ گلابی سنڈی کے متعلق آگاہی پروگرام گورنمنٹ اور پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں۔ تاکہ زمیندار بروقت اپنی فصل کو حملے سے محفوظ رکھ سکیں۔

پہلے اسپرے کے 15 دن کے بعد دوسرا اسپرے کریں۔

نوٹ: گلابی سنڈی کے ETL پر 7 دن کے وقت سے 2 اسپرے کریں۔

گلابی اور لشکری سنڈی کے حملہ کی صورت میں

لنس 200 ملی لیٹر

پروایسز 100 ملی لیٹر



ہمارے ریسرچ اور ڈولپمنٹ کے فیلڈ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ پرواینسز 100 ملی لیٹر فی اکیڑہ مقدار گلابی سنڈ یوں کے ساتھ ساتھ
ریڈ کاٹن گب اور ڈسکی کاٹن گب کا موثر کنٹرول کرتا ہے۔

یاد رکھنے کی باتیں...

- کپاس کی آخری چنانی کے بعد پودوں پر موجود ڈینڈوں کو ختم کرنے کیلئے بھیڑ، بکریاں چرنے کیلئے چھوڑ دی جائیں اور دیگر ڈینڈوں کو تلف کر دیا جائے۔
- ایندھن کیلئے رکھی گئی چھڑیوں کو سیدھا یعنی عمودی حالت میں کھڑا کیا جائے۔
- کپاس کی بجائی سے پہلے مٹی پلنے والا ہل چلا کر زمین کو دھوپ لگانی جائے۔
- بجائی کیلئے بر اتر اہواج استعمال کیا جائے۔
- ڈبل نیچ یعنی گھوڑے ہوئے نیچ کو صحت مند نیچ سے الگ کر لیا جائے۔
- گلابی سنڈ کا حملہ نظر آئے تو سپرے میں تاخیر نہ کی جائے۔
- اگریقی فصل کی کاشت سے اجتناب کیا جائے۔

مزید معلومات کیلئے

اُریسٹا لائٹ سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس : تحریک فلور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون: 3-34522611 (092-21) 75350 پاکستان۔ فون: 3-34522611 (092-21)
ریجنل آفس : 042-37513154 • 061-6537315-18 • 091-2964529 • 022-3880103 • ملکان: 0042-37513154 • لہور: 091-2964529
www.arystalifesciencepk.com

